

18/05/2013

RECORDATORIO

Consultas al SIM

Vacuna antigripal de aplicación intradérmica, en mayores de 59 años

*¿Es **correcto** administrar la vacuna antigripal de aplicación **intradérmica** (Istivac® ID), que contiene 9 ug /cepa, a una persona de 63 años de edad?*

No. La vacuna antigripal de administración intradérmica (ID) que contiene 9 ug del antígeno está indicada para adultos de 18 hasta 59 años de edad.

¿Qué conducta se debe seguir si por error se administra la vacuna antigripal ID de 9 ug /cepa, a una persona mayor de 59 años?

Dado que la dosis de 9 ug/cepa de esta vacuna, no resulta suficientemente inmunogénica para este grupo etáreo (lo que ocasiona una protección inadecuada), se recomienda seguir la misma conducta que ante cualquier caso de administración de una dosis de vacuna menor a la indicada.

En este caso se debe **revacunar** a la persona con la vacuna antigripal de administración intramuscular, con un intervalo de al menos 4 semanas.

Además, por tratarse de un error, se debe **reportar** el evento mediante una **ficha de notificación ESAVI** (Evento adverso Supuestamente Atribuido a Vacunación o Inmunización). Dicha ficha está disponible en la página web del Colegio (www.colfarsfe.org.ar) en el apartado: > *Farmacovigilancia* > *Notificación de ESAVI*

Bibliografía

- Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC; sigla en inglés). Recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, sigla en inglés). 28 de enero de 2011. Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm?s_cid=rr6002a1_e#Tab1
- Sanofi Pasterur. Istivac ID. Monografía del Producto.