

## Extensión de la indicación de la vacuna Menveo®

ANMAT. Disposición N° 6376

La extensión desde los 2 meses fue aprobada por la FDA el 1° de agosto de 2013.

Esta aprobación nos permite proteger ahora también a los lactantes, grupo con mayor riesgo frente a la enfermedad meningocócica.

Nueva indicación aprobada:

Menveo® es una vacuna indicada para la inmunización activa de niños (desde los 2 meses de edad), adolescentes y adultos para prevenir la enfermedad invasiva causada por *Neisseria meningitidis* serogrupos A, C, W-135 e Y, según recomendaciones oficiales.

Esquema de vacunación

|                                  | EDAD                                   | INMUNIZACIÓN PRIMARIA                                | DOSIS ENTRE LOS 12-24 MESES   |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| LACTANTES Y NIÑOS                | De 2 - < 6 meses de edad               | 3 dosis (2, 4 y 6 meses)<br>Intervalo mínimo 2 meses | 1 dosis entre los 12-16 meses |
|                                  | No vacunados<br>6-23 meses de edad (*) | 1 dosis  | 1 dosis entre los 12-24 meses |
| NIÑOS                            | 2-10 años de edad(**)                  | 1 dosis  |                               |
| ADOLESCENTES, ADULTOS Y GERONTES | ≥ 11 años (***)                        | 1 dosis  |                               |

(\*) En niños no vacunados de 6 a 23 meses de edad, Menveo debe ser administrado en dos dosis, cada una como dosis única de 0,5 ml, debiendo ser administrada la segunda dosis en el segundo año de vida y al menos dos meses después de la primera dosis.

(\*\*) Para niños entre 2 y 5 años de edad con elevado riesgo continuo de enfermedad meningocócica se puede administrar una segunda dosis 2 meses después de la primera dosis.

(\*\*\*) No existen datos para individuos mayores de 65 años de edad. Existen datos limitados en individuos de edades entre 56-65 años.

La necesidad y momento para una dosis de refuerzo de Menveo aún no han sido determinados.

**SITIO DE APLICACIÓN: Menores 12 meses: región anterolateral del muslo. Niños de 12 meses o mayores: región deltoidea.**

Información provista por el Laboratorio Novartis.