

31/08/17

FARMACOVIGILANCIA

Información destinada a los profesionales de la salud

Cloruro de Potasio por vía intravenosa. Riesgo de errores de medicación. ANSM. ANMAT.

La Agencia de Medicamentos de Francia (ANSM, siglas en francés) recibió reportes de errores de medicación relacionados principalmente con la administración intravenosa directa, sin dilución, de ampollas concentradas de Cloruro de Potasio (KCl). Estos errores pueden tener consecuencias graves o fatales para los pacientes.

A pesar de la implementación de acciones correctivas (modificación del rótulo, de la información presente en el prospecto del producto, difusión de afiche...), la ANSM todavía reconoce casos de errores de medicación, particularmente en relación con la técnica de preparación y con la administración.

La agencia recuerda que el KCl en solución hipertónica debe ser administrado por infusión intravenosa lenta, únicamente después de la dilución. Además, "los errores de administración de Cloruro de Potasio inyectable" son parte de la lista de 12 "eventos que nunca deberían suceder/Never Events" y debe ser parte de las prioridades de prevención en los establecimientos de salud.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Mayo de 2017.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**