

15/09/17

Meningococo B. Nueva vacuna en Argentina.

La vacuna meningocócica multicomponente del grupo B, Bexsero® (Lab. GSK), está disponible en Argentina.

Indicaciones

Bexsero® está indicada para la inmunización activa de individuos a partir de 2 meses de edad y mayores contra la enfermedad meningocócica invasiva causada por *Neisseria meningitidis* grupo B.

Posología

Grupo de edad	Inmunización primaria	Intervalos entre las dosis primarias	Dosis de refuerzo
Lactantes, 2 meses a 5 meses	Tres dosis cada una de 0,5 ml, con una primera dosis administrada a los 2 meses de edad ^a	No menor a 1 mes	Sí, una dosis entre los 12 y 23 meses de edad
Lactantes no vacunados, 6 meses a 11 meses	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 2 meses	Sí, una dosis en el segundo año de vida con un intervalo de al menos 2 meses entre la serie primaria y la dosis de refuerzo
Niños no vacunados, 12 meses a 23 meses	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 2 meses	Necesidad no establecida
Niños, 2 años a 10 años	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 2 meses	Necesidad no establecida
Adolescentes (de 11 años de edad) y adultos*	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 1 mes	Necesidad no establecida

*La seguridad y eficacia de Bexsero® en individuos mayores de 50 años de edad no ha sido establecida.

En **lactantes y niños (menores de 2 años de edad)** la **reacción adversa** local y sistémica más comúnmente observada en los ensayos clínicos fue sensibilidad y eritema en el sitio de inyección, fiebre e irritabilidad.

En **adolescentes y adultos**, las **reacciones adversas** locales y sistémicas más frecuentemente observadas fueron dolor en el sitio de inyección, malestar y cefalea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la fórmula.

Material extraído de: Vademécum Nacional de Medicamentos. Bexsero®. [Fecha última consulta: 13/09/2017]