

VACUNAS PARA ADULTOS

Septiembre 2017

<i>Vacuna</i>	<i>Usted necesita la vacuna...</i>
Doble adultos (dT) Protección para difteria, tétanos.	<ul style="list-style-type: none"> • Si pasaron más de 10 años del esquema completo de 3 dosis. • Si no se vacunó previamente o no tiene documentada la vacunación (carnet): recibirá dos dosis separadas por un mes y refuerzo entre 6 a 12 meses. • Si tiene el esquema incompleto: completarlo.
Triple bacteriana acelular (dTpa) Protección para difteria, tétanos y tos convulsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Si está embarazada: debe recibir 1 dosis de dTpa desde la semana 20 de gestación. Esta vacuna suma a la protección para difteria y tétanos, defensas para tos convulsa, enfermedad que puede ser grave para el bebé. Se aplica en cada embarazo.
Hepatitis B	<ul style="list-style-type: none"> • Si no se vacunó previamente: dos dosis separadas por un mes y una 3ª a los 6 meses. • Si tiene esquema incompleto: completarlo.
Triple Viral (TV) Protección para Sarampión-Rubéola-Paperas. Doble Viral (DV) Protección para Sarampión-Rubéola.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no tiene 1 dosis previa aplicada y es menor de 50 años, debe recibirla. En este momento frente a casos de paperas, se recomienda usar TV en vez de DV.
Gripe (o influenza) Protege de complicaciones de esta enfermedad.	<ul style="list-style-type: none"> • Si pertenece a grupos de riesgo. Cada otoño (o invierno) aplicar 1 dosis para su protección y para la protección de los que estén cerca de usted. Si no la recibió debe vacunarse mientras circule el virus de la gripe.
Hepatitis A	<p>Recomendada en manipuladores de alimentos, inundaciones, personal de laboratorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si tuvo hepatitis, se considera protegido, no necesita vacunarse. • Si no recuerda, se solicita un examen de sangre (IGG hep A). Si resulta negativo (IGG negativa) requiere 2 dosis de vacuna 0-6 meses.
Meningococo tetravalente ACYW	<p>Si pertenece a grupos de riesgo: personas con sistemas inmunológicos debilitados y quienes no poseen bazo.</p>

<p style="text-align: center;">Neumococo</p> <p style="text-align: center;">Protege para infecciones severas: meningitis, neumonía causadas por esta bacteria.</p> <p>Existen 2 vacunas</p> <p>1) conjugada 13 valente (VCN13-Prevenar) 2) polisacárida 23 valente (VPN23)</p> <p><i>Intervalo mínimo entre:</i> VPN23 - VPN23: 5 años VCN13 - VPN23: 1 año VPN23 - VCN13: 1 año</p> <p>En huéspedes con trastornos severos de las defensas VCN13 - VPN23: 2 meses VPN23 - VCN13: 2 meses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si usted tiene más de 65 años de edad con o sin enfermedades crónicas (asma, EPOC, diabetes, cardiopatías) <ul style="list-style-type: none"> - Y nunca recibió vacunas contra neumococo o no lo recuerda: debe recibir una dosis de VCN13 y al año una dosis de VPN23. - Y recibió una dosis VPN23 a los 65 años o más: debe recibir una dosis de VCN13 (con un intervalo mínimo de 1 año). - Y recibió una dosis de VPN23 antes de los 65 años: debe recibir una dosis de VCN13 (con intervalo mínimo de 12 meses) y un refuerzo de VPN23 con intervalo mínimo de 12 meses luego de la VCN13 y 5 años de la 1° dosis de VPN23. • Si usted tiene menos de 65 años de edad y enfermedades crónicas (asma, EPOC, diabetes, cardiopatías) <ul style="list-style-type: none"> - Y nunca recibió vacunas contra neumococo o no lo recuerda: debe recibir una dosis de VCN13 y al año una dosis de VPN23. A los 65 años de edad aplicar un refuerzo de VPN23 con un intervalo mínimo de 5 años luego de la 1° dosis de VPN23. - Y recibió una dosis de VPN23: debe recibir una dosis de VCN13 (con intervalo mínimo de 12 meses) A los 65 años de edad aplicar un refuerzo de VPN23 con un intervalo mínimo de 5 años luego de la 1° dosis de VPN23. • Si usted tiene menos de 65 años de edad y enfermedades renales, trastornos severos en el sistema de defensas, no posee bazo, tiene un implante coclear. <ul style="list-style-type: none"> - Y nunca recibió vacunas contra neumococo o no lo recuerda: debe recibir una dosis de VCN13, a los 2 meses una dosis de VPN23, a los 5 años un refuerzo de VPN23 y a los 65 años de edad, un segundo refuerzo de VPN23. - Y recibió una dosis de VPN23: debe recibir una dosis de VCN13 (con intervalo mínimo de 2 meses), a los 5 años un refuerzo de VPN23 y a los 65 años de edad, un segundo refuerzo de VPN23.
---	---

Estar vacunado es fundamental a lo largo de la vida para estar protegido