

01/10/15

FARMACOVIGILANCIA
Información destinada a los profesionales de la salud

Repaglinida. Contraindicación de uso concomitante con clopidogrel. HC. ANMAT.

La agencia canadiense de medicamentos (HC, siglas en inglés) informa que la co-administración de **repaglinida** y **clopidogrel** (un inhibidor del CYP2C8) puede conducir a una disminución significativa en los niveles de glucosa en sangre debido a una **interacción fármaco-fármaco**. Asimismo, **contraindica su uso en forma concomitante**.

Repaglinida es un antidiabético oral utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. El clopidogrel es un antiplaquetario oral usado para prevenir eventos aterotrombóticos.

Fuente: Health Canada. Gluconorm (repaglinide). New Contraindication for Concomitant Use with Clopidogrel. 31/07/2015. Disponible en: <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54454a-eng.php>

En Argentina se comercializan tres especialidades medicinales con este principio activo. En los últimos tres años (2012-2015), no se han recibido notificaciones de sospechas de reacciones adversas con repaglinida.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Julio de 2015.

Nombre Comercial	Laboratorio
Cravenorm®	Craveri
Glukenil®	Lazar
Sestrine®	Beta

Fuente: ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. [Fecha de la última consulta: 08/10/15]

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**