

07/04/17

FARMACOVIGILANCIA

Información destinada a los profesionales de la salud

Zostavax®. No utilizar en pacientes con función inmune comprometida. TGA.

La agencia reguladora de medicamentos de Australia (TGA, por sus siglas en inglés), emitió una alerta en la que advierte que la vacuna Zostavax® no debe ser usada en pacientes con función inmune comprometida.

Zostavax® es una vacuna viral atenuada del virus de la varicela zóster indicada en la prevención del herpes zóster en individuos ≥ 50 años de edad. No está indicada en el tratamiento del herpes zóster, ni como prevención de la primera infección por varicela. Algunas de las reacciones adversas más frecuentes, notificadas en $\geq 1\%$ de los sujetos vacunados son: dolor de cabeza y alergias en el sitio de aplicación. Se puede presentar hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia. Zostavax® tiene una carga viral 14 veces mayor que la vacuna contra la varicela en la infancia. Debido a lo anterior, las personas inmunocomprometidas o inmunodeficientes pueden desarrollar una enfermedad diseminada por el virus de la vacuna.

Algunas de las condiciones que comprometen la función inmune, y en los cuales se debe tener especial precaución son: pacientes con desnutrición, pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia, tuberculosis activa no tratada, VIH/SIDA, pacientes con antecedentes de esplenectomía (extirpación del bazo), personas en tratamiento con inmunosupresores (corticoesteroides sistémicos, azatioprina), entre otros.

Se recomienda a los profesionales de la salud que Zostavax® debe ser usada con precaución en pacientes con función inmune comprometida. De no estar seguro sobre las condiciones del paciente, es importante aplazar la vacunación y buscar asesoramiento especializado.

Los pacientes con condiciones médicas y/o que estén tomando medicamentos que afectan el sistema inmunológico deben de tener precaución y alertar al médico acerca de esta situación. En todo caso es el médico quien decidirá la aplicación.

Fuente: TGA. Zostavax® no debe utilizarse en pacientes con función inmune comprometida. 03/04/17. Disponible en: [http://cimuncol.blogspot.com.ar/2017/04/zostavax-no-debe-utilizarse-en.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+NoticiasCimun+\(Noticias+CIMUN\)](http://cimuncol.blogspot.com.ar/2017/04/zostavax-no-debe-utilizarse-en.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+NoticiasCimun+(Noticias+CIMUN))

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**