

31/08/17

**FARMACOVIGILANCIA**

Información destinada a los profesionales de la salud

**Brimonidina (Mirvaso®). Riesgo de efectos cardiovasculares sistémicos. MHRA. ANMAT.**

Una revisión de reportes post comercialización evidenció síntomas sistémicos luego del uso de Mirvaso®, que incluyen bradicardia, hipotensión (incluida ortostática) y mareos. Algunos pacientes requirieron hospitalización. Es importante evitar su uso en piel dañada o irritada, incluso luego de terapias con láser, condiciones que pueden aumentar la absorción del gel.

**Fuente:** ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Junio de 2017.

**Mirvaso®**  
**Brimonidina, tartrato 0,5%**  
**Gel tópico**

**Indicaciones**

Es una medicación con receta médica que se utiliza sobre la piel (tópico) para el tratamiento del enrojecimiento facial debido a la rosácea que no se elimina (persistente) en adultos mayores de 18 años.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio [www.colfarsfe.org.ar](http://www.colfarsfe.org.ar) en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**