

08/08/17

FARMACOVIGILANCIA

Información destinada a los profesionales de la salud

Bevacizumab (Avastin®) y stents colorrectales. Aumento de riesgo de perforación intestinal. HC. ANMAT.

Debido a estudios publicados que reportaron un mayor riesgo de ruptura intestinal en pacientes que recibieron ambos tratamientos al mismo tiempo, *Health Canada* (HC) revisó el riesgo de ruptura intestinal de los stents colorrectales utilizados con Bevacizumab. La revisión de HC concluyó que hay evidencia limitada que sugiere un mayor riesgo de ruptura intestinal cuando se utilizan juntos stents colorrectales y bevacizumab para tratar a pacientes con cáncer de colon.

En los últimos tres años (2014 – febrero 2017) se han registrado 264 notificaciones de sospechas de reacciones adversas con bevacizumab, incluyendo 2 reportes de perforación intestinal.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Febrero de 2017.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**