

08/08/17

FARMACOVIGILANCIA

Información destinada a los profesionales de la salud

Heparinas de bajo peso molecular. Riesgo potencial de hematoma espinal/epidural. HC. ANMAT.

Health Canada (HC) revisó la información relacionada con el riesgo, conocido y raro, de hematoma espinal/epidural en pacientes que reciben Heparinas de Bajo Peso Molecular (LMWH, siglas en inglés) para prevenir coágulos sanguíneos mientras se someten a anestesia espinal/epidural o punción espinal. La revisión se inició debido a una actualización de la FDA de la información de seguridad de LMWH relacionada con este riesgo. Esta revisión concluyó que el riesgo de sangrado puede aumentar si el procedimiento espinal se realiza poco después de la inyección de LMWH.

La agencia canadiense solicitó a los fabricantes de LMWH que actualicen la información de seguridad sobre la duración de tiempo recomendada entre la inyección de LMWH y la anestesia espinal/epidural o punción espinal. Este período puede variar, pero debe ser determinado por el prescriptor de acuerdo con las recomendaciones de la información de seguridad canadiense.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Febrero de 2017.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**