

01/08/17

FARMACOVIGILANCIA

Información destinada a los profesionales de la salud

Trametinib (Mekinist®). Riesgo de colitis y perforación gastrointestinal. HC. ANMAT.

En pacientes que utilizan Mekinist® se reportaron colitis y perforación gastrointestinal, incluyendo desenlace fatal.

La monoterapia con Mekinist® o en combinación con dabrafenib debe utilizarse con precaución en pacientes con factores de riesgo de perforación gastrointestinal, incluyendo antecedentes de diverticulitis, metástasis en el tracto gastrointestinal, y uso concomitante de medicamentos con un riesgo reconocido de perforación gastrointestinal. Se debe informar a los pacientes que busquen atención médica inmediata si desarrollan síntomas de colitis y perforación gastrointestinal.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Enero de 2017.

Mekinist® es un inhibidor de la quinasa indicado como agente único y en combinación con dabrafenib, para el tratamiento de pacientes con melanoma metastásico o no reseccable con mutaciones BRAF V600E o V600K.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**