

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LA FARMACOVIGILANCIA

Caraballo, A.; Amherdt, A.; Araya, M.; Asinari, M.; Ávalos, Y.; Boscovich, J.; Bugna, L.; Burgi, J.; Clavé, M.; Coassolo, A.; Facino, M.; Galliari, D.; González, A.; Grigolato, V.; Imhof, S.; Pagani, M.; Sen, V.; Sosa, A.

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe - 1º C.

INTRODUCCIÓN

Los medicamentos por tener acción farmacológica, pueden desencadenar reacciones adversas (RAMs) de diferentes intensidades y frecuentemente prevenibles.⁽¹⁾

La Farmacovigilancia es la herramienta indispensable para la prevención y detección de RAMs pero presenta debilidades.⁽²⁾

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, 1° C., realiza actividades para colaborar a fortalecerla.

OBJETIVO

Describir acciones llevadas a cabo por farmacéuticos para contribuir a fortalecer la Farmacovigilancia a partir de la determinación de conocimientos y prácticas de médicos y farmacéuticos e información de prospectos de medicamentos.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo-transversal. Se elaboraron cuatro **instrumentos de evaluación** (IE) para aplicar respectivamente en cuatro actividades relacionadas a Farmacovigilancia (2017-2018).

IE Lista de cotejo (Fig. 1) aplicada a la información de las planillas de recolección de datos (Fig. 2) y las hojas de reporte (Fig. 3) de un trabajo efectuado en 62 farmacias localizadas en el centro-norte de la Prov. de Santa Fe. El trabajo consistió en detectar síntomas de miopatía relacionados al uso de estatinas y realizar el correspondiente reporte al Sistema Nacional de Farmacovigilancia.

IE2 Cuestionario con preguntas cerradas, algunas dicotómicas y otras de opciones múltiples (Fig. 4), realizado a pediatras en una reunión científica.

IE3 Test pre-capacitación con preguntas cerradas y de opciones múltiples (Fig. 5), efectuado a farmacéuticos en un taller sobre glaucoma.

IE4 Lista de cotejo (Fig. 6) aplicada a los prospectos de antidepresivos, del Vademécum Nacional de Medicamentos (ANMAT), agrupados por Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA).

Considerando los resultados obtenidos de los IE, en cada una de las cuatro actividades, se realizaron respectivas tormentas de ideas; la finalidad fue determinar posibles **acciones de intervención**. Se seleccionó una intervención por tormenta de ideas, teniendo en cuenta los destinatarios y recursos disponibles. Se implementó la seleccionada.

RESULTADOS

Mediante el **IE1** se pudo constatar que, de 34 casos en los que se detectaron síntomas de miopatía, solo se reportaron 13 (38%). De éstos, 8 no contenían todos los datos necesarios para la imputabilidad por lo que se contactó con los notificadores y se pudo obtener la información faltante.

Como **intervención** se elaboró y difundió un procedimiento modelo: “Notificación a los sistemas de vigilancia sanitaria” (Fig. 7), para adaptar e implementar en farmacias.

La aplicación del **IE2** reveló que 41 (93%) pediatras señalaron conocer el concepto de Farmacovigilancia; pero solo 2 (4,9%) respondieron correctamente otras preguntas relacionadas con este concepto.

La **intervención** consistió en la participación en 2 actividades de actualización de la Sociedad Argentina de Pediatría, presentando casos de Farmacovigilancia para reforzar su concepto.



Farm. Diego Galliari.
Jornada de Gastroenterología.
Infliximab. Importancia de la Farmacovigilancia.
13 de julio de 2018



Farm. Laura Bugna.
Taller Traumatología y Ortopedia
Hospital de Niños O. Alassia
31 de agosto de 2018

El **IE3** puso de manifiesto que 9 (37,5%) farmacéuticos desconocían que los antidepresivos pueden desencadenar Glaucoma de Ángulo Estrecho (GAE).

Como **intervención** se elaboraron recomendaciones para pacientes en tratamiento con antidepresivos (Fig. 8) y material informativo destinado a farmacéuticos (Fig. 9), y se enviaron a los colegiados.

Figura N° 8. Información para entregar a los pacientes en tratamiento con antidepresivos





Figura N° 9. Información sobre antidepresivos y riesgo de Glaucoma de Ángulo Estrecho para el farmacéutico



Figura Nº 10
Informe para ANMAT. Resultados de
una búsqueda de información en los
prospectos de antidepresivos en relación
a Glaucoma de Ángulo Estrecho



CONCLUSIONES

Es necesario realizar acciones permanentes para fortalecer la Farmacovigilancia, dirigidas a profesionales, pacientes y autoridad sanitaria, fomentando la capacitación de profesionales y la información al paciente, y colaborando con ANMAT.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1- Papale R.; Schiaffino S. Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia Edición Latinoamérica. 1a. Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ediciones Farmacológicas, 2018. Disponible en: file:///C:/Users/mp00105/Downloads/manual_de_fvg_edicion_latam.pdf

2- Organización Panamericana de la Salud. Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas. Diciembre 2010. Disponible en: <http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Technical-Doc-5-web>