

03/01/2020

**FARMACOVIGILANCIA**

**Información destinada a los profesionales de la salud**

**Clopidogrel. Cambios en su absorción por opioides**

Se ha actualizado en el Reino Unido el resumen de características del producto Plavix<sup>®</sup>, 75 mg de clopidogrel, comprimido recubierto, indicado en la prevención secundaria de eventos aterotrombóticos, a fin de agregar la siguiente información:

**4.5 Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción**

Al igual que con otros inhibidores orales de Cit. P2Y12, la administración conjunta de agonistas opioides tiene el potencial de retrasar y reducir la absorción de clopidogrel, presumiblemente debido al vaciado gástrico lento. La relevancia clínica es desconocida. Considere el uso de un agente antiplaquetario parenteral en pacientes con síndrome coronario agudo que requieren la administración conjunta de morfina u otros agonistas opioides.

**Material extraído de:** Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe (Red CIMLAC). 10/12/19. Disponible en:  
[http://web2.redcimlac.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2512:alertas-de-seguridad-hierro-dextran-clopidogrel&catid=4:noticias-de-interes&Itemid=31](http://web2.redcimlac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2512:alertas-de-seguridad-hierro-dextran-clopidogrel&catid=4:noticias-de-interes&Itemid=31)

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla**. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio [www.colfarsfe.org.ar](http://www.colfarsfe.org.ar) en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**