

VACUNAS ANTIGRIPALES. Dosis y vía de administración

➤ **Vacunas trivalentes**

En relación a la dosis y la vía de administración de la vacuna trivalente contra la influenza, se debe tener en cuenta la edad del paciente. Ello de acuerdo al cuadro que se adjunta a continuación:

Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía
6-35 meses	0,25 ml	2*	Intramuscular
3-9 años	0,5 ml	2*	Intramuscular
> 9 años	0,5 ml	1	Intramuscular
Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular

*A partir de los 6 meses de vida y hasta los 9 años deben administrarse dos dosis, con un intervalo mínimo de cuatro semanas, para aquellos niños que reciben por primera vez la vacuna influenza.

A partir de los 9 años, es suficiente **una sola dosis** de 0,5 ml.

Los menores de nueve años que hubieran recibido al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis.

➤ **Vacunas tetravalentes**

Para las vacunas tetravalentes contra la influenza debe consultarse las especificaciones del fabricante. Actualmente en Argentina están disponibles dos marcas comerciales de esta vacuna.

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Istivac4® Lab. Sanofi Pasteur SA	6 meses a < de 9 años	0,5 ml	2*	Intramuscular o subcutánea
	9 – 17 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea
Afluria® Quad Lab. Seqirus	5 años a < 9 años	0,5 ml	2**	Intramuscular o subcutánea profunda
	9 - 18 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda

* Para los niños de 6 meses a menos de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

**Para los niños de 5 años a menos de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

Procedimiento para la aplicación

- Debe permitirse que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su administración.
- Limpiar el tercio medio del músculo con algodón humedecido en agua destilada, o alcohol 70°.
- Fijar la masa muscular. Aplicar la vacuna por vía intramuscular en ángulo de 90° o SC profunda.
- Luego de inyectar, extraer la aguja y presionar con el algodón sin masajear. Descartar la jeringa con aguja en el recipiente descartador de materiales cortopunzantes

Bibliografía

- ANMAT. Dosis y vía de administración de la Vacuna Trivalente. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_dosis_via_administracion_vacuna_trivalente.pdf [Fecha última consulta: 08/04/2020]
- ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. Afluria® Quad Lab. Seqirus. Prospecto. Disponible en: <http://anmatvademecum.servicios.pami.org.ar/index.html> [Fecha última consulta: 08/04/2020]
- ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. Istivac4 Lab. Sanofi Pasteur SA. Prospecto. Disponible en: <http://anmatvademecum.servicios.pami.org.ar/index.html> [Fecha última consulta: 08/04/2020]
- Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Vacunación Antigripal. Argentina / 2018. Manual del Vacunador. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001137cnt-2018-03_lt_vacuna-gripe-2018.pdf