

Buenos Aires, 11 de agosto de 2020

Ref: Prospecto Vacuna Bexsero (Vacuna Meningocócica Multicomponente del Grupo B (Recombinante, Adsorbida):

Estimado/a:

Para su información queremos recordarle los últimos cambios del prospecto vigente de la vacuna Bexsero en 2019 y 2020

- 1) Posología: un refuerzo a considerar a partir de los 2 años en individuos en continuo riesgo de exposición a enfermedad meningocócica de acuerdo a recomendaciones oficiales.

Edad de la primera dosis	Inmunización primaria	Intervalos entre las dosis primarias	Dosis de refuerzo
Lactantes, 2 meses a 5 meses	Tres dosis de 0,5 ml cada una	No menor a 1 mes	Sí, una dosis entre los 12 y 23 meses de edad con un intervalo de al menos 6 meses entre las series primarias y la dosis de refuerzo
Lactantes, 3 meses a 5 meses	Dos dosis de 0,5 ml cada una	No menor a 2 meses	
Lactantes, 6 meses a 11 meses	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 2 meses	Sí, una dosis en el segundo año de vida con un intervalo de al menos 2 meses entre la serie primaria y la dosis de refuerzo
Niños, 12 meses a 23 meses	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 2 meses	Sí, una dosis con un intervalo de 12 a 23 meses entre la serie primaria y la dosis de refuerzo
Niños, 2 años a 10 años	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 1 mes	Una dosis de refuerzo debe ser considerada en individuos en continuo riesgo de exposición a enfermedad meningocócica, de acuerdo con las recomendaciones oficiales
Adolescentes (de 11 años) y adultos*	Dos dosis cada una de 0,5 ml	No menor a 1 mes	Una dosis de refuerzo debe ser considerada en individuos en continuo riesgo de exposición a enfermedad meningocócica, de acuerdo con las recomendaciones oficiales

2) Otras modificaciones incorporadas: a) datos de persistencia de la vacuna en niños y adolescentes, b) riesgo aumentado de enfermedad invasiva causada por *Neisseria meningitidis* grupo B en los individuos que reciben tratamiento que inhibe la activación del complemento terminal (por ejemplo, eculizumab) incluso después de la vacunación con BXSERO, c) co-administración con Menveo (vacuna conjugada contra meningococo de los serogrupos A, C, W-135 e Y) y d) en datos post-comercialización, rash en adolescentes desde 11 años de edad y en adultos.

La información para prescribir completa de Bexsero se encuentra escaneando el código QR



o ingresando en:

https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/es_AR/protected/products/pdfs/Bexsero/IP_Bexsero_GDS008_clean2.pdf.

Para solicitar información médica puede contactarse con nuestro servicio de información médica a mila@gsk.com o al teléfono 0800-220-4752.

Saludos cordiales,

María Beatriz Seoane

Directora Médica Vacunas GSK