

**Definición de caso sospechoso de COVID-19. Actualización 14-09-2020**

**Criterio 1\***

**Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas:**

- Fiebre (37,5 °C o más)
- Tos
- Odinofagia
- Dificultad respiratoria
- Mialgias
- Cefalea
- Diarrea/vómitos (tomados como un solo síntoma)

Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda severa.

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica

**Ó**

**Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada**

**Criterio 2**

**Toda persona que:**

- **Sea trabajador de salud**
- **Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada\***
- **Sea Personal esencial\*\***
- **Resida en barrios populares o pueblos originarios\*\*\***
- **Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 14 días posteriores al contacto:**

Presente **1 o más** de estos síntomas: fiebre (37,5 °C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato.

\*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños

\*\*se considera personal esencial:

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas

Personas que brinden asistencia a personas mayores

\*\*\* Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares

### **Criterio 3**

#### **SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO\* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA:**

\*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud

**Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días:**

**Y dos de los siguientes:**

- a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies).
- b) Hipotensión o shock.
- c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP).
- d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).
- e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal).

**Y**

Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina.

**Y**

Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos)

**\*NOTA: los síntomas cefalea y diarrea y/o vómitos aislados, sólo deben considerarse en zonas de circulación comunitaria o ante la presencia de nexo epidemiológico claro (contactos de casos confirmados, antecedente de viaje a zona con circulación).**

- El paciente menor de 16 años deberá ser aislado desde el inicio de la sospecha hasta la confirmación o resultado negativo del test, siempre en compañía de un adulto menor de 65 años que no presente comorbilidades y tenga disponibilidad para compañía permanente.

**Referencia:** Ministerio de Salud. Provincia de Santa Fe. Protocolo de COVID19 Santa Fe 14-09-2020.