

### Vacunas antigripal y antineumocócicas. Esquemas

Dado que en esta época del año se comienza la vacunación a los adultos mayores contra el neumococo y contra la gripe, se detalla a continuación los esquemas recomendados en **mayores de 65 años**.


#### Vacunas antineumocócicas

Las **vacunas contra el neumococo** que pueden utilizarse en la población adulta, están elaboradas **con antígenos inactivados**.


- Vacuna polisacárida de 23 serotipos (**VPN23**). **Pneumovax 23**<sup>®</sup>. Laboratorio Merck Sharp Dhome
- Vacuna conjugada de 13 serotipos (**VCN13**). **Prevenar 13**<sup>®</sup>. Laboratorio Pfizer S.R.L.

#### Esquemas para mayores de 65 años

1. Personas  $\geq 65$  años que nunca recibieron vacunas contra neumococo



2. Personas  $\geq 65$  años que recibieron previamente VPN 23 a los 65 años o más



3. Personas  $\geq 65$  años que recibieron VPN23 antes de los 65 años



#### Vacuna antigripal

Esta vacuna está elaborada **con antígenos inactivados**.

Se aplica una dosis anualmente.

**La vacuna antineumocócica (VCN13 o VCN23) y la vacuna antigripal pueden aplicarse simultáneamente (pero en lugares anatómicos diferentes), o con cualquier intervalo entre dosis.**



## Más información

### Esquemas de vacunación para neumococo en mayores de 5 años

| Población objetivo   | Esquemas de vacunación  | esquema final   |
|--|---|---|
| <b>Inmunocomprometidos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas / VIH (+)</li> <li>• Insuficiencia renal crónica / Síndrome nefrótico</li> <li>• Leucemia, Linfoma y enfermedad de Hodgkin / Mieloma múltiple</li> <li>• Enfermedades neoplásicas</li> <li>• Inmunodepresión farmacológica</li> <li>• Trasplante de órgano sólido</li> <li>• Asplenia funcional o anatómica<sup>(1)</sup></li> <li>• Anemia de células falciformes</li> <li>• Implante coclear</li> <li>• Fístula de LCR</li> </ul> | 1º dosis: VCN13<br><b>2º dosis: VPN23 con un intervalo mínimo de 8 semanas luego de la VCN13.</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">             Si hubiese recibido como 1º vacuna VPN23 deberá respetar los siguientes intervalos mínimos según la edad para recibir VCN13:<br/>             Menores de 18 años: 8 semanas<br/>             Mayores de 18 años: 12 meses           </div> 1º refuerzo: VPN23 a los 5 años de la dosis anterior de VPN23<br><br>2º refuerzo: VPN23 a los 65 años (si el 1º refuerzo fue administrado antes de los 60 años) | 1 dosis VCN13 +<br>1 dosis de VPN23 +<br><b>1º refuerzo VPN23</b><br><br><b>SOLO 2º refuerzo VPN23 si recibió el 1º a edad &lt; 60 años</b> |
| <b>No inmunocomprometidos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cardiopatía crónica</li> <li>• Enfermedad pulmonar crónica</li> <li>• Diabetes mellitus</li> <li>• Alcoholismo</li> <li>• Enfermedad hepática crónica</li> <li>• Tabaquismo</li> </ul>  | 1º dosis: VCN13<br><b>2º dosis: VPN23 con un intervalo mínimo de 12 meses luego de la VCN13.</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">             Si hubiese recibido como 1º vacuna VPN23 deberá respetar los siguientes intervalos mínimos según la edad para recibir VCN13:<br/>             Menores de 18 años: 8 semanas<br/>             Mayores de 18 años: 12 meses           </div> 1º refuerzo: VPN23 a los 65 años (con intervalo mínimo de 5 años de la dosis anterior)   | 1 dosis VCN13 +<br>1 dosis de VPN23<br><br><b>SOLO 1º refuerzo VPN23 si recibió el 1º a edad &lt; 60 años</b>                               |
| <b>Trasplante de células hematopoyéticas<sup>(2)</sup></b>   | VCN13: 4 dosis (0, 2 y 4 meses y refuerzo al año). Iniciar la vacunación luego de 6 o más meses del trasplante. A los 12 meses de finalizado el esquema con VCN13 administrar 1 dosis de VPN23. Reemplazar esta por VCN13 si hubiera Enfermedad Injerto Contra Huésped (EICH)   | 3 dosis VCN13 +<br>1 dosis de VPN23 =<br>4 dosis  |
| <b>Mayores de 65 años</b>  | 1º dosis VCN13.<br><b>2º dosis: VPN23 con un intervalo mínimo de 12 meses luego de la VCN13.</b>  | <b>1 dosis VCN13 +<br/>           1 dosis de VPN23<br/>           SIN REFUERZOS</b>   |

<sup>(1)</sup> Si se trata de una esplenectomía programada, debe administrarse idealmente la vacuna 2 semanas antes de la misma

<sup>(2)</sup> Para los receptores de trasplantes de células hematopoyéticas la recomendación es administrar un esquema primario completo (4 dosis) dada la pérdida de la memoria inmunológica producto de la inmunosupresión característica de este procedimiento.

Todos los niños entre 2 y 5 años deberán contar con esquema completo de vacuna contra neumococo con VCN13 (estrategia iniciada en el año 2011). Aquellos niños que no cuenten con vacuna, recibirán 1 dosis de VCN13. Si pertenecen a alguno de los grupos de riesgo, deberán completar con VPN23 para cumplir con el esquema secuencial en base a lo referido antes

*Elaboración: Dra. Andrea Uboldi. Fuente Lineamientos Nacionales de Vacunación contra neumococo.*