

17/05/2021

VACUNAS ANTIGRIPALES TETRAVALENTES Y TRIVALENTES
Dosis y vía de administración
Actualización

➤ **Vacunas tetraivalentes**

Actualmente en Argentina están disponibles las siguientes marcas comerciales de esta vacuna.

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Istivac4® Lab. Sanofi Pasteur SA	6 meses a < de 9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea
	9 – 17 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea
Afluria® Quad JUNIOR Lab. Seqirus	6 meses a 35 meses	0,25	1 ó 2**	Intramuscular o subcutánea profunda
Afluria® Quad Lab. Seqirus	3 años a < 9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea profunda
	9 a < 18 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
	≥ 18 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
Influvac Tetra® Lab. Abbott	3 años a < 9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea profunda
	9 – 17 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
Fluarix Tetra® Lab. GlaxoSmithKline Argentina S. A.	6 meses a < 9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular
	≥9 años	0,5 ml	1	Intramuscular

* Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

** Para los niños menores de 35 meses que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

Se recomienda consultar en el prospecto las especificaciones del fabricante.

> Vacunas trivalentes

En relación a la dosis y la vía de administración de la vacuna trivalente contra la influenza, se debe tener en cuenta la edad del paciente. Ello de acuerdo al cuadro que se adjunta a continuación:

Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
6-35 meses	0,25	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea profunda
3-9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea profunda
> 9 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda

* Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

A la fecha, fueron liberados lotes de las siguientes vacunas:

Agrippal S1 Lab. Seqirus

Virafly y Virafly Pediátrica Lab. Sinergium Biotech

> Vacuna trivalente adyuvada

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Fluxvir® Lab. Sinergium Biotech	Adultos > de 65 años	0,5 ml	1	Intramuscular

Se puede consultar los lotes liberados de vacunas antigripales en:

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/vacunas/antigripales_2021/lotes

Bibliografía

- ANMAT. Dosis y vía de administración de la Vacuna Trivalente. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_dosis_via_administracion_vacuna_trivalente.pdf [Fecha última consulta: 17/05/2021]

- ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. [Fecha última consulta: 17/05/2021]