

Medición de Presión Arterial en personas con Hipertensión Arterial diagnosticada

Criterios de actuación en Farmacia Comunitaria

Presión Arterial (mm de Hg)	RECOMENDACIONES		
	Paciente SIN FR CV o comorbilidades	Paciente CON FR CV o comorbilidades	Embarazada
PAS: 130-134 y/o PAD: 80-84	Visita médica anual Controlar PA y modificar estilo de vida	Visita médica trimestral Controlar PA y modificar estilo de vida	Visita médica Controlar PA
PAS: 135-139 y/o PAD: 85-89	Visita médica anual Controlar PA y modificar estilo de vida	Visita médica trimestral Controlar PA y modificar estilo de vida	Concurrir al médico lo antes posible
PAS: 140-159 y/o PAD: 90-99	Consultar al médico en < 3 meses Controlar PA y modificar estilo de vida	Consultar al médico en < 1 mes Controlar PA y modificar estilo de vida	
PAS: 160-179 y/o PAD: 100-109	Consultar al médico en < 1 mes Controlar PA y modificar estilo de vida	Consultar al médico en < 15 días Controlar PA y modificar estilo de vida	Remitir a urgencias
PAS: ≥180 y/o PAD: ≥110	Remitir a urgencias si luego de un reposo de 15 minutos persiste elevación de la PA ≥180 / 110		
PAS: < 90 y/o PAD: < 60	Asintomático: derivar en < 3 semanas Sintomático (lipotimias, síncope o caídas regulares): Remitir a urgencias		

FR CV: Factores de riesgo cardiovasculares; **PA:** Presión Arterial; **PAS:** Presión Arterial Sistólica o PA máxima; **PAD:** Presión Arterial Diastólica o PA mínima

Bibliografía: Benítez M, Torras-Borrell J, Villasuso B, Penín O. Diagnóstico. Criterios de seguimiento, control y derivación. Farm Com. 2022 Sep 02; 14 (Supl 2 Especial HTA): 18-24. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2022).HTA.003

Fecha: 03/02/2023