

### Vacuna QDENGA® Laboratorio Takeda

Esta vacuna contra el dengue, tetravalente (contra los 4 serotipos del virus del dengue), es a **virus vivos atenuados**.

Su condición de venta es: **Bajo Receta**.

#### Indicaciones

Está indicada para la prevención del dengue en **personas a partir de los 4 años de edad**.

#### Dosis y vías de administración

El esquema consta de **2 dosis separadas por al menos 3 meses** (0 y 3 meses). Aunque pase más de 3 meses de la aplicación de la 1º dosis, se aplica la 2º dosis; es decir, NO se reinicia el esquema.

Se administra por **vía subcutánea**, preferentemente en la región deltoidea.

#### Reacciones adversas/viremia postvacunal

En los estudios clínicos, las reacciones notificadas con más frecuencia en sujetos de 4 a 60 años de edad fueron dolor en el lugar de inyección (50 %), cefalea (35 %), mialgia (31 %), eritema en el lugar de inyección (27 %), malestar (24 %), astenia (20 %) y fiebre (11 %).

Estas reacciones adversas generalmente ocurrieron en los 2 días posteriores a la inyección, fueron de intensidad leve a moderada, tuvieron una duración breve (de 1 a 3 días) y fueron menos frecuentes luego de la segunda dosis que después de la primera dosis.

En el estudio clínico se observó una viremia vacunal transitoria después de la vacunación con Qdenga en el 49 % de los participantes del estudio que no habían sufrido la infección del dengue anteriormente y en el 16 % de los participantes del estudio que sí la habían sufrido con anterioridad.

La viremia vacunal comenzaba normalmente en la segunda semana tras la primera dosis, y su duración media era de 4 días. La viremia vacunal se asoció en algunos sujetos a síntomas transitorios de leves a moderados, como cefalea, artralgia, mialgia y erupción. Rara vez se ha detectado viremia vacunal después de la segunda dosis.

#### Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes que contiene la vacuna o hipersensibilidad a una dosis previa de Qdenga.
- Personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, incluidos los tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia o altas dosis de corticoesteroides sistémicos (p. ej., 20 mg/día o 2 mg/kg de peso corporal por día de prednisona durante 2 semanas o más) en las 4

semanas previas a la vacunación, al igual que con otras vacunas a virus vivos atenuados.

- Personas con infección sintomática por VIH o con infección asintomática por VIH cuando va acompañada de indicios de deterioro de la función inmunitaria.
- Embarazadas.
- Mujeres en período de lactancia.

### **Precauciones**

- La vacunación debe posponerse en sujetos que padezcan una enfermedad febril aguda grave.
- Las personas que tuvieron dengue deben esperar 6 meses para la aplicación de la vacuna.

### **Uso simultáneo con otras vacunas**

- **Con vacunas a virus vivos atenuados** (Triple Viral, Doble Viral; contra la Varicela, Fiebre Amarilla, Fiebre Hemorrágica Argentina): se puede aplicar al mismo tiempo pero en diferentes sitios del cuerpo, o separadas por un mes.
- **Con vacunas inactivadas:** se puede aplicar al mismo tiempo pero en diferentes sitios del cuerpo, o con cualquier intervalo.

### **Bibliografía**

- Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Santa Fe, 1 °C. Conferencia "Dengue. Vacuna y otras medidas preventivas" Dra. Andrea Uboldi. Enero 2024. Disponible en: <https://colfarsfe.org.ar/>
- FEFARA. Curso: "Actualización en vacunas 2024" Dra. Andrea Uboldi. Marzo de 2024
- Qdenga®. Ficha Técnica. Disponible en: [https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20221205157583/anx\\_157583\\_es.pdf](https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20221205157583/anx_157583_es.pdf)