

VACUNAS ANTIGRIPALES. Dosis y vía de administración. Actualización 2024

VACUNAS TETRAVALENTES

| Nombre comercial | Edad | Dosis | Nº de dosis | Vía de administración |
|---|-----------------------|---------|-------------|-------------------------------------|
| Istivac4® Lab. Sanofi Pasteur S.A. | 6 meses a < de 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2* | Intramuscular o subcutánea |
| | 9 – 17 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea |
| | Adultos | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea |
| Afluria® Quad Junior Lab. Seqirus | 6 meses a 35 meses | 0,25 ml | 1 ó 2** | Intramuscular o subcutánea profunda |
| Afluria® Quad Lab. Seqirus | 3 años a < 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2* | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | 9 a < 18 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | ≥ 18 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea profunda |
| Influvac® Tetra Abbott Laboratories Argentina S.A. | 3 años a < 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2* | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | 9 – 17 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | Adultos | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea profunda |
| Fluarix® Tetra Lab. GSK Biopharma Argentina S.A. | 6 meses a < 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2* | Intramuscular |
| | ≥9 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular |
| Flucelvax® Quad Lab. Seqirus S.A. (1) | 6 meses a < de 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2* | Intramuscular |
| | ≥9 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular |
| 4 Flu® Pediátrica Lab. Sinergium Biotech S.A. | 6 meses a 35 meses | 0,25 | 1 ó 2** | Intramuscular o subcutánea profunda |
| 4 Flu® Lab. Sinergium Biotech S.A. | 3 años a < 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2* | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | ≥9 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea profunda |
| GC Flu® Lab. Tuteur S.A.C.I.F.I.A | 6 meses a < 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2* | Intramuscular |
| | ≥9 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular |

* Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

** Para los niños menores de 35 meses que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

(1) Vacuna desarrollada en cultivo celular. No contiene proteína de huevo, antibióticos ni conservante.

Vacunas tetravalente de Dosis Alta^a

| Nombre comercial | Edad | Dosis | Nº de dosis | Vía de administración |
|--|------------------|--------|-------------|-----------------------|
| Efluelda[®] Lab. Sanofi Pasteur S.A. | Adultos ≥65 años | 0,7 ml | 1 | Intramuscular |

a- Contiene 240 microgramos (mcg) de hemaglutinina (HA) del virus de la influenza por dosis de 0,7 ml en la proporción indicada de 60 mcg HA de cada una de las cuatro cepas recomendadas para la temporada 2024.

VACUNAS TRIVALENTES

Vacunas trivalentes NO adyuvadas

| Nombre comercial | Edad | Dosis | Nº de dosis | Vía de administración |
|---|-------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| Virafly[®] Lab. Sinergium Biotech | 6 a 35 meses | 0,25 ml | 1 ó 2 ^I | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | 3 años a < 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2 ^{II} | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | ≥9 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea profunda |
| Virafly[®] Pediátrica Lab. Sinergium Biotech S.A. | 6 a 35 meses | 0,25 ml | 1 ó 2 ^I | Intramuscular o subcutánea profunda |
| Influvac[®] Abbott Laboratories Argentina S.A. | 6 a 35 meses | 0,25 | 1 ó 2 ^I | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | >de 36 meses a < 9 años | 0,5 ml | 1 ó 2 ^{II} | Intramuscular o subcutánea profunda |
| | Adultos | 0,5 ml | 1 | Intramuscular o subcutánea profunda |

^I Para los niños menores de 35 meses que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

^{II} Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

Vacuna trivalente adyuvada

| Nombre comercial | Edad | Dosis | Nº de dosis | Vía de administración |
|---|----------------------|--------|-------------|-----------------------|
| Fluxvir[®] Lab. Sinergium Biotech (2) | Adultos ≥ de 65 años | 0,5 ml | 1 | Intramuscular |

(2) La vacuna se presenta como una suspensión blanquecina.

Se recomienda consultar en el prospecto de cada vacuna, las especificaciones del fabricante.

Procedimiento para la aplicación

- Debe permitirse que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su administración.
- Limpiar el tercio medio del músculo con algodón humedecido en agua destilada, o alcohol 70°.
- Fijar la masa muscular. Aplicar la vacuna por vía intramuscular en ángulo de 90° o SC profunda.
- Descartar la jeringa con aguja en el recipiente descartador de materiales cortopunzantes.

Bibliografía

- ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. [Fecha última consulta: 08/04/2024]
- ANMAT. Vacunas Antigripales. Temporada 2024. Lotes liberados de la vacuna. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/vacunas> [Fecha última consulta: 08/04/2024]
- Ministerio de Salud. República Argentina. Guía Rápida Vacunación Antigripal 2024. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2024-03/guia_vacunacion_antigripal_1332024.pdf