



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Memorándum uso de vacuna monovariante SPIKEVAX XBB.1.5 contra COVID-19 del laboratorio Moderna en personas desde los 6 meses de edad.

---

**Memorándum uso de vacuna monovariante SPIKEVAX XBB.1.5 contra COVID-19 del laboratorio Moderna en personas desde los 6 meses de edad.**

Spikevax® XBB.1.5 monovariante está indicada para la inmunización activa con el fin de prevenir las complicaciones y muertes por el virus SARS-CoV-2.

El 8 de abril del corriente año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT), bajo la disposición “DI-2024-3229-APN-ANMAT#MS” dispuso el uso de la vacuna Spikevax® monovariante XBB.1.5 en **personas de 6 meses de edad o más**, para **esquema inicial** y para **dosis de refuerzo**.

Spikevax® monovariante XBB.1.5, se presenta en viales multidosis que contienen 2,5 ml. Cada ml de suspensión inyectable contiene 50 g de andusomerán, es decir 0,1 mg/mL. De cada vial se pueden extraer 5 dosis de 0,5 mL o 10 dosis de 0.25 mL, según la edad de la persona a vacunar.

La vacuna MODERNA monovariante XBB 1.5 se utilizará para esquemas primarios y dosis de refuerzo en personas de 6 meses a 11 años inclusive.

Asimismo, se continuará utilizando la vacuna Pfizer bivariante (Original/Ómicron BA.4/BA.5) para dosis de refuerzo en personas en personas de 12 años o más.

Es importante destacar que todas las vacunas cumplen adecuados estándares de seguridad y eficacia por tanto, la mejor opción es aplicarse la vacuna que se encuentra disponible en el vacunatorio.

**Tabla 1. Vacuna monovariante XBB.1.5 personas sin inmunocompromiso**

| <b>Edad</b>      | <b>Esquema</b>    | <b>Cantidad de dosis (intervalo)</b>  | <b>Pauta posológica</b> |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 6 meses a 5 años | Esquema primario* | 2 dosis (intervalo mínimo de 28 días) | 25 mcg (0,25 mL)        |
|                  | Refuerzo          | 1 dosis (intervalo mínimo de 4 meses) | 25 mcg (0,25 mL)        |
| 6 a 11 años      | Esquema primario* | Dosis única                           | 25 mcg (0,25 mL)        |
|                  | Refuerzo          | 1 dosis (intervalo mínimo de 4 meses) | 25 mcg (0,25 mL)        |

**Tabla 2. Esquema en personas con inmunocompromiso**

| <b>Edad</b>       | <b>Esquema</b>    | <b>Cantidad de dosis (intervalo)</b>  | <b>Pauta posológica</b> |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 6 meses a 11 años | Esquema primario* | 3 dosis (intervalo mínimo de 28 días) | 25 mcg (0,25 mL)        |
|                   | Refuerzo          | 1 dosis (intervalo mínimo de 4 meses) | 25 mcg (0,25 mL)        |

\*Las personas que recibieron esquema primario con otra vacuna como Sinopharm, Spikevax o Pfizer

monovariante original deberán completar el esquema con la vacuna disponible.

Se incluye en este grupo a:

- Personas bajo tratamiento oncológico para tumores sólidos y onco-hematológicos.
- Personas receptoras de trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor.
- Personas receptoras de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los últimos 2 años o en tratamiento inmunosupresor.
- Personas con inmunodeficiencia primaria moderada o grave.
- Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral.
- Personas bajo tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas, otros inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.
- Personas con enfermedades autoinmunes.
- Personas con enfermedad renal crónica bajo tratamiento de hemodiálisis.

