

**Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio a las embarazadas,
en Farmacias Comunitarias de la Provincia de Santa Fe**

Resumen

- **Se requiere prescripción médica donde debe constar la edad gestacional.** TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE APLICAR LA VACUNA: la edad gestacional indicada en la prescripción y la fecha de prescripción, para determinar la edad gestacional al momento de la aplicación de esta vacuna.
- Es gratuita
- **Esquema:** Dosis única entre las semanas 32 y 36,6 (36 semanas y 6 días) de gestación
- **Dosis:** 0,5 ml
- Esta vacuna **requiere reconstitución.**
- **Vía de administración:** Intramuscular
- **Sitio de aplicación:** Músculo deltoides (tercio superior del hombro externo)
- **Co-administración con otras vacunas:** Simultánea o independiente del intervalo con otras vacunas de calendario indicadas durante la gestación (antigripal, triple bacteriana acelular, COVID-19)
- **Conservación:** a temperaturas entre 2 °C y 8 °C.
- **Información en casos de desvíos temporales de temperatura:**
 - Se ha demostrado la estabilidad química y física (en uso) durante 4 horas entre 15 °C y 30 °C. Desde el punto de vista microbiológico, la vacuna se debe aplicar inmediatamente después de reconstituída.
 - El vial sin abrir es estable durante 5 días cuando se conserva a temperaturas de 8 °C a 30 °C. Después de este período, se debe desechar.
- **Efectos adversos más frecuentes**
 - Dolor en el sitio de aplicación
 - Cefaleas
 - Mialgias
 - Náuseas

**Ante cualquier evento supuestamente atribuible a la vacunación,
se debe realizar el reporte**