

29/07/2025

FARMACOVIGILANCIA

Información destinada a los profesionales de la salud

Vacunas contra Virus Sincicial Respiratorio: bajo riesgo de síndrome de Guillain-Barré tras la vacunación en adultos mayores. MHRA

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) puede causar neumonía en adultos mayores y, en algunos casos, requerirse hospitalización. En los bebés puede ocasionar bronquiolitis, una infección respiratoria y necesitarse tratamiento hospitalario.

La vacuna contra el VSR ayuda a proteger contra este virus. Existen dos vacunas Abrysvo® Lab. Pfizer y Arexvy® Lab. GSK.

Información para profesionales de la salud

- Existe un pequeño aumento del riesgo de síndrome de Guillain-Barré tras la vacunación con Abrysvo® o Arexvy® en adultos (de 60 años o más). Actualmente, no hay evidencia de un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré en mujeres embarazadas tras la vacunación con Abrysvo®, la única vacuna contra el VSR aprobada para su uso durante el embarazo.
- Estar atento a los signos y síntomas del síndrome de Guillain-Barré en todas las personas vacunadas con Abrysvo® o Arexvy® para asegurar un diagnóstico temprano y correcto, iniciar cuidados de apoyo y tratamiento adecuados y descartar otras causas.

El **síndrome de Guillain-Barré** es una afección nerviosa grave. Generalmente afecta primero los brazos y las piernas, antes de presentar síntomas en otras partes del cuerpo.

Es posible que primero se sienta hormigueo, entumecimiento o pinchazos en los pies y las manos. A esto suele seguirle debilidad muscular y dificultad para mover las articulaciones.

Otros síntomas pueden incluir:

- debilidad muscular y dificultad para mover las articulaciones
- dolor agudo y punzante (dolor nervioso), a menudo en las piernas o la espalda
- problemas para respirar
- problemas en la cara, como músculos faciales caídos o dificultad para tragar o hablar
- problemas en los ojos, tales como visión doble

Los síntomas en algunas personas se vuelven tan graves que no pueden mover las piernas, los brazos ni la cara (parálisis).

- Se requiere tratamiento hospitalario urgente para ayudar a prevenir la progresión de los síntomas y mejorar la recuperación; sin embargo, los efectos del síndrome de Guillain-Barré a veces pueden ser duraderos.

Información extraída de: Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, siglas en inglés) del Reino Unido. Abrysvo ▼ (Pfizer RSV vaccine) and Arexvy ▼ (GSK RSV vaccine): be alert to a small risk of Guillain-Barré syndrome following vaccination in older adults. 07/07/2025. Disponible en: <https://www.gov.uk/drug-safety-update/abrysvo-pfizer-rsv-vaccine-and-arexvy-gsk-rsv-vaccine-be-alert-to-a-small-risk-of-guillain-barre-syndrome-following-vaccination-in-older-adults>

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas. Puede realizarse a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**