

10/03/2026

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA DE 20 SEROTIPOS

Esquema de vacunación en personas "CON ANTECEDENTES de haber recibido esquema secuencial previamente", según edad y/o factores de riesgo

Grupo poblacional	Antecedente de vacunación	Esquema propuesto	Esquema alternativo*
Personas de 5 a 17 años inclusive con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI, fístula de LCR o implante coclear	VCN13	VCN20 1 dosis con intervalo $\geq$ 8 semanas	VPN23 1 dosis con intervalo $\geq$ 8 semanas
	VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo $\geq$ 8 semanas	
	VCN13-VPN23	No requiere dosis adicional	
Personas de 5 a 17 años HIC	VCN13	VCN20 1 dosis con intervalo $\geq$ 8 semanas	
	VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo $\geq$ 8 semanas	
	VCN13-VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo $\geq$ 5 años de la última dosis antineumocócica	
Personas de 18 a 64 años con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI	VCN13	1 dosis VCN20 con intervalo $\geq$ 12 meses	VPN23 1 dosis con intervalo $\geq$ 12 meses**
	VPN23	1 dosis VCN20 con intervalo $\geq$ 12 meses	
	VCN13 - VPN23	No requiere dosis adicional**	
Personas de 18 a 64 años HIC, fístula de LCR y/o implante coclear	VCN13	1 dosis VCN20 con intervalo $\geq$ 12 meses	
	VPN23		
	VCN13 - VPN23	1 dosis VCN20 con intervalo $\geq$ 5 años de última dosis	
Personas 65 años y más	VCN13	1 dosis VCN20 con intervalo $\geq$ 12 meses	
	VPN23		
	VCN13 - VPN23 (recibidas antes o después de los 65 años)	1 dosis VCN20 con intervalo $\geq$ 5 años de última dosis	

ENI: Enfermedades Neumocócicas Invasivas. HIC: Huéspedes con Inmunocompromiso. VCN13: Vacuna conjugada contra neumococo de 13 serotipos. VCN20: Vacuna conjugada contra neumococo de 20 serotipos. VPN23: Vacuna polisacárida contra neumococo de 23 serotipos.

*Aquellas personas con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI que recibieron VCN13 previamente, pueden recibir como esquema alternativo la vacuna VPN23 si estuviera disponible, como se describe en esta columna. Se recomienda idealmente continuar esquema con VCN20 en personas con inmunocompromiso y mayores de 65 años.

** Aquellas personas de 18 a 64 años con riesgo aumentado de ENI que recibieron esquema secuencial VCN13-VPN23, se recomienda 1 (una) dosis de VCN20 a partir de los 65 años con un intervalo de al menos 5 años respecto a la última dosis de vacuna antineumocócica.

Información extraída de: Vacuna Antineumocócica Conjugada de 20 serotipos en mayores de 5 años. Lineamientos Técnicos y Manual de Vacunación. Ministerio de Salud. República Argentina. Abril 2024. Disponible en: https://colfarsfe.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/lineamiento_tecnico_vcn20_2024.pdf