

10/03/2026

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA DE 20 SEROTIPOS

Esquema de vacunación. Calendario Nacional de Vacunación

La Vacuna Conjugada contra Neumococo de 20 serotipos (VCN20) reemplazará el esquema actual de Vacuna Conjugada contra Neumococo de 13 serotipos (VCN13) en el Calendario Nacional (2 dosis + 1 refuerzo).

- 1º dosis: 2 meses de edad
- 2º dosis: 4 meses de edad
- Refuerzo: 12 meses de edad

Durante el período de transición y coexistencia de VCN13 y VCN20 se priorizará el uso de la vacuna VCN20 en niños que presenten mayor riesgo de Enfermedad Neumocócica Invasiva (huéspedes especiales).

Los niños sanos que inicien esquemas o hayan iniciado su vacunación con VCN13 deberán completarlo con VCN13 mientras haya disponibilidad de esta vacuna en el sector público. Cuando la misma no esté disponible, iniciarán o completarán esquema con VCN20.

Es importante remarcar que los lactantes y niños que hayan comenzado la inmunización con otra vacuna antineumocócica conjugada pueden completar la inmunización pasando a VCN20 en cualquier momento del cronograma.

Los esquemas de vacunación del Calendario Nacional se continuarán recuperando en niños sanos hasta los 5 años de edad, como se encuentra contemplado actualmente.

Esquemas de vacunación en menores de 5 años (inclusive) de edad con factores de riesgo para Enfermedad Neumocócica Invasiva (Huéspedes Especiales)*, según edad y antecedente de vacunación

Grupo poblacional	Antecedentes de vacunación	Esquema	Dosis totales de VCN 13 y/o VCN20
Entre 2 a 6 meses (inclusive) incluidos prematuros	Si inicio esquema con VCN13 completar con VCN20	3+1 3 dosis (intervalo de 8 semanas entre dosis) + 1 refuerzo (a los 12 meses de vida)	4 (cuatro)
Entre 7 a 11 meses (inclusive)	Si inicio esquema con VCN13 completar con VCN20	2+1 2 dosis (intervalo 8 semanas entre dosis)	3 (tres)

		+ 1 refuerzo (a los 12 meses de vida)	
Entre 12 y 23 meses (inclusive)	Si inicio esquema con VCN13 completar con VCN20	1+1 2 dosis (intervalo 8 semanas entre dosis)	2 (dos)
Entre 24 a 71 meses (inclusive)	Si inicio esquema con VCN13 completar con VCN20	1+1 2 dosis (intervalo 8 semanas entre dosis)	2 (dos)
	Esquema completo VCN13 + VPN23	No requiere dosis adicional	2 (dos)

VCN13: Vacuna conjugada contra neumococo de 13 serotipos. VCN20: Vacuna conjugada contra neumococo de 20 serotipos. VPN23: Vacuna polisacárida contra neumococo de 23 serotipos.

Los niños receptores de trasplante de células hematopoyéticas (TCH) el esquema completo es de 4 dosis:

- Tres dosis de VCN20 con un intervalo interdosis de 4 semanas, comenzando la vacunación entre los 3 y 6 meses post TCH.
- Una cuarta dosis o refuerzo de VCN20 a partir de los 6 meses de la tercera dosis o 12 meses del TCH (lo que ocurra más tarde).

Quienes hayan iniciado esquema con VCN13 deberán completar esquema con VCN20.

*Huéspedes especiales

Inmunocompromiso	Enfermedades con aumento de riesgo de ENI
• Diálisis o síndrome nefrótico • Asplenia funcional o anatómica • Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas • Infección por VIH • Enfermedad de células falciformes u otras hemoglobinopatías • Enfermedades neoplásicas • Leucemia y Linfoma • Inmunodepresión farmacológica o radioterapia • Trasplante de órgano sólido • Trasplante de médula ósea	• Fístula de líquido cefalorraquídeo • Enfermedad cardíaca crónica • Enfermedad renal crónica (sin requerimiento de diálisis) • Enfermedad hepática crónica • Enfermedad pulmonar crónica (incluyendo asma persistente moderada y severa) • Implante coclear • Diabetes mellitus

Información extraída de: Vacuna contra Neumococo. Transición a la vacuna contra 20 serotipos en el Calendario Nacional de Vacunación. Lineamientos Técnicos y Manual de Vacunación. Ministerio de Salud. República Argentina. Enero 2025. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/02/vacuna_neumococo_transicion_26022025.pdf