

09/03/2026

VACUNAS ANTIGRIPALES. Dosis y vía de administración. Actualización 2026

Las vacunas antigripales incluidas en el cuadro son aquellas con lotes liberados por ANMAT (5/3/2026)

VACUNAS TETRAVALENTES

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Influvac® Tetra Abbott Laboratories Argentina S.A.	3 años a < 9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea profunda
	9 – 17 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda

* Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

VACUNAS TRIVALENTES

Vacunas trivalentes NO adyuvantadas

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Agrippal® S1 Laboratorios Seqirus S.A.	6 a 35 meses	0,25 ml	1 ó 2 ^I	Intramuscular o subcutánea profunda
	3 años a < 9 años	0,5 ml	1 ó 2 ^{II}	Intramuscular o subcutánea profunda
	≥9 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
Agrippal® S1 Junior Laboratorios Seqirus S.A.	6 a 35 meses	0,25 ml	1 ó 2 ^I	Intramuscular o subcutánea profunda
Influvac® Abbott Laboratories Argentina S.A.	6 a 35 meses	0,25 ml	1 ó 2 ^I	Intramuscular o subcutánea profunda
	>de 36 meses a < 9años	0,5 ml	1 ó 2 ^{II}	Intramuscular o subcutánea profunda
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda

^I Para los niños menores de 35 meses que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

^{II} Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda

dosisdeshués de un intervalo de al menos 4 semanas.

Vacuna trivalente adyuvantada

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Fluad® (1) Laboratorios Seqirus S.A	Adultos ≥ de 65 años (2)	0,5 ml	1	Intramuscular

(1) La vacuna se presenta como una suspensión blanquecina lechosa.

(2) Según prospecto, Fluad® está indicada para personas de 50 años de edad y mayores.

Se recomienda consultar en el prospecto de cada vacuna, las especificaciones del fabricante.

Procedimiento para la aplicación

- Debe permitirse que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su administración.
- Limpiar el tercio medio del músculo con algodón humedecido en agua destilada o alcohol 70°.
- Fijar la masa muscular. Aplicar la vacuna por vía intramuscular en ángulo de 90° o SC profunda.
- Descartar la jeringa con aguja en el recipiente descartador de materiales cortopunzantes.

Bibliografía

- ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. [Fecha última consulta: 09/03/2026]
- ANMAT. Vacunas Antigripales. Temporada 2026. Lotes liberados de la vacuna. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/lotes-de-vacunas-antigripales-liberados-2026> [Fecha última consulta: 09/03/2026]
- Ministerio de Salud. República Argentina. Vacunación Antigripal 2026. Lineamientos Técnicos de Vacunación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/02/lineamientos_vacuna_antigripal_-_2026.pdf