

08/04/2026

VACUNAS ANTIGRIPALES. Dosis y vía de administración. Actualización 2026

Las vacunas antigripales incluidas en el cuadro son aquellas con lotes liberados por ANMAT (08/04/2026)

VACUNAS TETRAVALENTES

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Influvac® Tetra Abbott Laboratories Argentina S.A.	3 años a < 9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea profunda
	9 – 17 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
Istivac4® Sanofi Health Argentina S.A.	6 meses a < de 9 años	0,5 ml	1 ó 2*	Intramuscular o subcutánea
	9 – 17 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea

* Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

VACUNAS TRIVALENTES

Vacunas trivalentes NO adyuvantadas

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Agrippal® S1 Laboratorios Seqirus S.A.	6 a 35 meses	0,25 ml	1 ó 2 ^I	Intramuscular o subcutánea profunda
	3 años a < 9 años	0,5 ml	1 ó 2 ^{II}	Intramuscular o subcutánea profunda
	≥9 años	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda
Agrippal® S1 Junior Laboratorios Seqirus S.A.	6 a 35 meses	0,25 ml	1 ó 2 ^I	Intramuscular o subcutánea profunda
Influvac® Abbott Laboratories	6 a 35 meses	0,25 ml	1 ó 2 ^I	Intramuscular o subcutánea profunda

Argentina S.A.	>de 36 meses a < 9años	0,5 ml	1 ó 2 ^{II}	Intramuscular o subcutánea profunda
	Adultos	0,5 ml	1	Intramuscular o subcutánea profunda

^I Para los niños menores de 35 meses que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

^{II} Para los niños menores de 9 años que no han sido vacunados previamente, debe administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

Vacuna trivalente adyuvantada

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Fluad® (1) Laboratorios Seqirus S.A	Adultos ≥ de 65 años (2)	0,5 ml	1	Intramuscular

(1) La vacuna se presenta como una suspensión blanquecina lechosa.

(2) Según prospecto, Fluad® está indicada para personas de 50 años de edad y mayores.

Vacunas trivalente de Dosis Alta

Nombre comercial	Edad	Dosis	Nº de dosis	Vía de administración
Efluelda® (1) Sanofi Health Argentina S.A.	Adultos ≥65 años (2)	0,5 ml	1	Intramuscular

(1) Contiene 60 mcg hemaglutinina (HA) de cada una de las tres cepas del virus de la influenza recomendadas para la temporada 2026, por dosis de 0,5 ml.

(2) Según prospecto, Efluelda® está indicada para personas de 60 años de edad y mayores.

Se recomienda consultar en el prospecto de cada vacuna, las especificaciones del fabricante.

Procedimiento para la aplicación

- Debe permitirse que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su administración.
- Limpiar el tercio medio del músculo con algodón humedecido en agua destilada o alcohol 70°.
- Fijar la masa muscular. Aplicar la vacuna por vía intramuscular en ángulo de 90° o SC profunda.
- Descartar la jeringa con aguja en el recipiente descartador de materiales cortopunzantes.

Bibliografía

- ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. [Fecha última consulta: 12/03/2026]

- ANMAT. Vacunas Antigripales. Temporada 2026. Lotes liberados de la vacuna. Disponible en:

<https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/lotes-de-vacunas-antigripales-liberados-2026> [Fecha última consulta: 08/04/2026]

- Ministerio de Salud. República Argentina. Vacunación Antigripal 2026. Lineamientos Técnicos de Vacunación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/02/lineamientos_vacuna_antigripal_-_2026.pdf