

28/08/2026

FARMACOVIGILANCIA
Información destinada a los profesionales de la salud

Metotrexato. Riesgo de necrosis epidérmica. AEMPS

Se han notificado casos de necrosis epidérmica durante el tratamiento con metotrexato, en su mayoría acompañados de leucopenia, trombocitopenia y lesiones en las mucosas. Esta reacción cutánea puede parecerse clínicamente al síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) o a la necrólisis epidérmica tóxica (NET).

Se debe informar a los pacientes sobre los signos y síntomas de las reacciones cutáneas adversas graves y sobre la necesidad de acudir inmediatamente al médico si observan alguno de ellos. Si aparecen signos y síntomas que sugieran estas reacciones, se debe suspender inmediatamente el tratamiento con metotrexato e iniciar el tratamiento apropiado. Se ha descrito el uso de ácido fólico para la necrosis epidérmica. El metotrexato no debe reintroducirse salvo que se haya descartado la presencia de SSJ y NET.

Información extraída de: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano. Junio de 2026. Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-junio-de-2026/>

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas. Puede realizarse a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**