

28/08/2026

FARMACOVIGILANCIA
Información destinada a los profesionales de la salud

Terbinafina. Riesgo de púrpura trombocitopénica trombótica. AEMPS

Se han notificado casos de púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), algunos de ellos con desenlace mortal, asociados al tratamiento con terbinafina. La PTT se caracteriza por trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática y puede acompañarse de síntomas neurológicos, disfunción renal o fiebre.

Si se sospecha la presencia de PTT, el tratamiento con terbinafina debe interrumpirse inmediatamente, realizar las pruebas diagnósticas pertinentes e iniciar el tratamiento de la PTT. Si se confirma el diagnóstico, se debe suspender la administración de este medicamento.

Información extraída de: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano. Junio de 2026. Disponible en:
<https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-junio-de-2026/>

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas. Puede realizarse a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**