

Recomendaciones de vacunación frente a las inundaciones

Prevención de tétanos

1. **Niños menores /igual a 6 años** completar esquema según edad

2. **Niños a partir de los 7 años**

- Si tienen esquema completo **no** se requieren dosis.
- Con esquemas incompletos aplicar las dosis faltantes independientemente del tiempo transcurrido.
- Sin antecedentes vacunal iniciar esquema (0-1- 6 meses).

3. **Adolescentes**

- Si tienen esquema completo **no** se requieren dosis (verificar vacuna triple bacteriana acelular a los 11 años). Refuerzos cada **10 años** con vacuna Doble Bacteriana (difteria/Tétanos).
- Con esquemas **incompletos** aplicar las dosis faltantes independientemente del tiempo transcurrido.
- Sin antecedente vacunal iniciar esquema (0-1-6 meses).

4. **Adultos**

- Con esquemas completos (3 dosis o más) aplicar refuerzo con vacuna Doble Bacteriana cada 10 años.
- Con esquemas incompletos aplicar las dosis faltantes independientemente del tiempo transcurrido.
- Sin antecedente vacunal iniciar esquema (0-1-6 meses).

5. **Embarazadas**

- Aplicar vacuna Triple Bacteriana Acelular, a partir de la semana **20** de gestación.

Conducta ante heridas

- **Esquema completo (3 dosis o más con componente antitetánico)** adelantar el refuerzo si **pasaron más de 6 años** de la última dosis.

- **Esquema incompleto (menos de 3 dosis) o desconocido** deberán recibir **gammaglobulina antitetánica** más **vacuna** con componente antitetánico correspondiente por edad.

Prevención de Hepatitis A

Es esperable que todos los individuos desde **1 año a 22 años** (RN a partir del 2004)
tengan **una dosis** de vacuna Hepatitis A aplicada a partir de los **12 meses de edad**.

- Esquema completo no necesitan refuerzos.
- Esquema incompleto en individuos de 1 a 22 años (RN a partir 2004) aplicar 1 dosis de vacuna Hepatitis A.

Por encima de **22 años** evaluar **antecedentes** de vacunas y/o enfermedad. **Todo aquel personal de salud que permanezca más de 20 días en zona de inundación y no tenga constancia de enfermedad o vacuna aplicada, debe recibirla.**

A partir de los 16 años, aplicar doble de dosis de formulación pediátrica o dosis de adultos.

Vaxipat® 500U/ml y Healive® aplicar **1 ml** a partir de los **16 años, vía intramuscular**.
Siempre verificar la presentación existente y punto de corte para adultos.

Prevención de Gripe

Según situación epidemiológica, se sugiere vacunar los grupos definidos en los lineamientos nacionales de Vacunación Antigripal 2026.

Importante: Anticipándonos a las inundaciones se recomienda que todo el personal de salud, voluntarios, empleados comunales y todos los que trabajen en terreno deben contar con las vacunas recomendadas.

