

13/10/2026

FARMACOVIGILANCIA
Información destinada a los profesionales de la salud

Cefalexina. Prolongación del Tiempo de Protrombina. FDA

El Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER, por sus siglas en inglés) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos ha aprobado modificaciones con respecto a la información de seguridad en el prospecto del medicamento que contiene cefalexina. Entre otros datos añadidos y/o revisados:

Reacciones adversas

Tiempo de protrombina prolongado (ver Advertencias y Precauciones)

Entre las Advertencias y Precauciones de información de FDA, refiere sobre este dato de seguridad:

Prolongación del tiempo de protrombina: Las cefalosporinas pueden asociarse con una prolongación del tiempo de protrombina. Los pacientes con mayor riesgo incluyen aquéllos con insuficiencia renal o hepática o un estado nutricional deficiente, así como los que reciben un tratamiento antibacteriano prolongado o tratamiento anticoagulante. Se debe monitorizar el tiempo de protrombina en los pacientes de riesgo y gestionarlo según se encuentre indicado.

Información extraída de: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Agosto 2026. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/novedades_agosto_2026.pdf

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas. Puede realizarse a través de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar en el apartado **Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de Eventos Adversos**